



# Le piégeage

Deux principales périodes de piégeage sont envisageables :



## Le piégeage de printemps

**Objectif :** limiter le nombre de fondatrices et donc le nombre de futurs nids, et ainsi contribuer à diminuer la pression des attaques d'automne.




**Attention :** Le piégeage de printemps doit se faire de manière ciblée, pour diminuer le risque de piégeage d'autres espèces. Les pièges doivent être placés dans les lieux de passage des frelons asiatiques : à proximité des ruchers, près de l'emplacement des anciens nids, etc.



## Le piégeage d'automne

**Objectif :** Diminution de la prédation au rucher. La pression sur les ruchers est grande à cette période car les frelons cherchent une alimentation riche en sucre. Ce piégeage doit être massivement mis en place pour protéger les colonies susceptibles d'être fortement attaquées et dépeuplées.

## Le cycle du frelon asiatique et du piégeage



Phase A	Les fondatrices quittent leur refuge d'hiver. Elles sont à la recherche de nourriture sucrée et d'un lieu pour construire un nouveau nid.
Phase B	Chaque fondatrice construit un premier nid, bâtit les cellules, pond des oeufs et élève les futures ouvrières.
Phase C	La construction des nids secondaires a lieu en été. La colonie est développée et nécessite un nid bien plus grand que le premier. En été les ouvrières doivent rapporter des proies pour nourrir le couvain et peuvent être attirées par un appât protéiné. Plus tard en automne, elles doivent rapporter de la nourriture sucrée pour les adultes restés au nid.
Phase D	Les sexués s'envolent pour s'accoupler. Les mâles et femelles ne passeront pas l'hiver. Seules les futures reines survivront et chercheront un nouvel abri. Le nid est abandonné.
Décembre à mi-février	Éviter le piégeage à cette époque pour limiter la capture d'autres espèces.